



Informe semanal de Vigilancia de la Gripe en España

Semana 05/2017 (30 de enero - 5 de febrero de 2017)

Nº 494. 9 de febrero de 2017

La onda epidémica gripal 2016-17 en claro descenso en España, mientras se mantiene el predominio de virus de la gripe A(H3N2)

- Vigilancia epidemiológica: Sistemas centinela
- Vigilancia virológica
- Brotes de gripe
- Vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe
- Mortalidad relacionada con gripe
- Vigilancia internacional de la gripe

- En la semana 05/2017 la tasa global de incidencia de gripe desciende a 135,64 casos por 100.000 habitantes, tras alcanzar el pico de la onda epidémica de esta temporada en la semana 03/2017.
- La tasa de detección de virus gripales se sitúa en 34%, en descenso desde el máximo alcanzado en previas semanas (68%). Desde el inicio de la temporada, se observa una circulación mayoritaria de virus A (99%) con un predominio casi absoluto de A(H3N2) entre los subtipados (99%).
- La tasa de detección de virus respiratorio sincitial (10%) se mantiene en descenso desde que se alcanzó un máximo en la tasa de detección viral en la semana 51/2016 (34%).
- Se han notificado 34 brotes de gripe en diez CCAA, 27 en residencias geriátricas, seis en instituciones sanitarias y uno en centro de personas con discapacidad. En todos se ha identificado el virus A (100% de A(H3N2), entre los subtipados).
- Desde el inicio de la temporada 2016-17 se han notificado 1.994 casos graves hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) en 17 CCAA. En el 99,5% de los pacientes se identificó el virus de la gripe A. (99,4% de A(H3N2) entre los A subtipados). Se han registrado 249 defunciones confirmadas, asociándose todas ellas a virus A [138 A(H3N2), 110 A no subtipado y una A(H1N1)pdm09] y el 84% en mayores de 64 años. El 48% de los CGHCH, y el 49% de los que cursaron una evolución fatal, no habían recibido la vacuna antigripal de esta temporada.
- Se detecta un exceso de mortalidad por todas las causas desde la semana 01/2017, que se concentra casi exclusivamente en los mayores de 64 años.
- La actividad gripal en la zona templada del hemisferio norte continúa incrementándose, especialmente en Europa y Este de Asia. A nivel mundial, A(H3N2) es el virus predominante. La actividad gripal en Europa en la semana 04/2017 sigue estando elevada, cinco países señalan una intensidad alta o muy alta. La tasa de detección gripal en muestras centinela continúa elevada (51%, por encima del 10% desde la semana 46/2016) y el 98% de los virus subtipados corresponde a A(H3N2).
- Coincidiendo con el inicio de la onda epidémica, se publicó un informe de situación sobre la evolución de la actividad gripal en España en la temporada 2016-17 a semana 50/2016 que ha sido actualizado a semana 03/2017, al alcanzar el pico de dicha onda epidémica. Más información puede consultarse [aquí](#)

Información adicional sobre la vigilancia de gripe en España puede consultarse en la Web del [SVGE](#) y [aquí](#)


Vigilancia epidemiológica: Sistemas centinela

En la semana 05/2017 se ha recibido información de vigilancia de gripe de todas las redes integradas en el Sistema centinela de vigilancia de gripe en España (ScVGE). Aunque aún se observa una evolución creciente de la actividad gripal en las redes de Ceuta y Extremadura, en el resto decrece o es estable. En Asturias, el pico de la actividad gripal se alcanzó en la semana 52/2016, y en las demás redes centinela entre las semanas 1 y 3 de 2017. Se señala un nivel de intensidad medio en Castilla la Mancha, Ceuta, Extremadura, Madrid y Melilla; baja en Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Navarra y País Vasco, y basal en el resto. La difusión de la enfermedad es epidémica en todo el territorio vigilado excepto en Asturias, Ceuta y Navarra, donde es local, La Rioja, donde es esporádica y en Canarias, donde es nula.

La tasa global de incidencia de gripe en la semana 05/2017 desciende a 135,64 casos por 100.000 habitantes (Razón de tasas: 0,70; IC 95%: 0,65-0,76), tras alcanzar el pico de máxima incidencia gripal de la temporada 2016-17 en la semana 03/2017 (Figura 1). Se señala una difusión epidémica, un nivel de intensidad bajo y la evolución es decreciente.


Se observa un descenso de la incidencia de gripe en todos los grupos de edad, que es significativo en los menores de 65 años. La afectación de la enfermedad es mayor en los menores de 15 años y en los adultos jóvenes de 15-64 años (Figura 2).

Figura 1. Tasa de incidencia semanal de gripe y número de detecciones virales. Temporada 2016-17. Sistemas centinela. España



Fuente: CNE. Sistema centinela de Vigilancia de Gripe en España

Figura 2. Evolución de la incidencia de la gripe por grupos de edad. Temporada 2016-17. Sistemas centinela. España




Fuente: CNE. Sistema centinela de Vigilancia de Gripe en España

Figura 3. Difusión geográfica de la incidencia de gripe. Temporada 2016-17. Sistemas centinela. España

En el mapa de la difusión espacio-temporal de la incidencia de gripe de la semana 04/2017 se observa una intensificación de la actividad gripal en casi todo el territorio sujeto a vigilancia, con zonas de aún mayor actividad en Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla La Mancha y norte de Andalucía (Figura 3).

Más información sobre el análisis geográfico de la incidencia de gripe puede consultarse [aquí](#).

Por problemas en el desarrollo computacional se ofrece la información geográfica correspondiente a una semana previa a este informe.



Vigilancia virológica

En la semana 05/2017 se enviaron a los laboratorios del sistema 333 muestras centinela, de las que 114 (34%) han sido positivas para el virus de la gripe: todos virus tipo A (100% de A(H3N2) entre los subtipados). Tras alcanzar la máxima tasa de detección viral en la semana 52/2016 (68%), y aunque con alguna fluctuación, se observa una tendencia descendente desde entonces* (Figura 4).

Además, esta semana se han notificado 276 detecciones no centinela (274 tipo A y 2 tipo B), siendo A(H3N2) el 99% de los subtipados.

Desde el inicio de la temporada 2016-17, de las 3.558 muestras centinela analizadas, 1.763 (50%) fueron positivas a virus gripales: el 99,3% fueron virus A, 0,5% B y 0,2% virus C (Figura 5). Entre los 1.569 virus A subtipados (90%), más del 99% son virus A(H3N2). Además se notificaron 4.565 detecciones no centinela: 99,6% A [99,7% A(H3N2) y 0,3% A(H1N1)pdm09, entre los subtipados (35%)], 0,4% B y 0,1% C.

*Los datos notificados en semanas previas se actualizan cada semana, por lo que podrían variar en función de la semana de presentación de los informes.

Figura 4. Muestras centinela analizadas y porcentaje de detecciones de virus de la gripe. Temporada 2016-17. España





Figura 5. Detecciones centinela de virus de la gripe por tipo/subtipo de virus. Temporada 2016-17 España



Fuente: CNE. Sistema centinela de Vigilancia de Gripe en España

Basándose en el estudio de la hemaglutinina, el Centro Nacional de Microbiología ha caracterizado genéticamente 242 virus de la gripe A(H3N2), 185 del grupo 3C.2a1 (A/Bolzano/7/2016), 53 del grupo 3C.2a (A/HongKong/4801/2014), ambos grupos concordantes con la cepa vacunal de la temporada 2016-17, y 4 del grupo 3C.3a (A/Switzerland/9715293/2013). Se han caracterizado también 3 virus A(H1N1), todos ellos del grupo 6B.1 (A/Michigan/45/2015). En lo que respecta a virus B, se han caracterizado 6 virus, todos ellos del grupo representado por B/Brisbane/60/2008 (linaje Victoria), y por tanto, concordantes con la cepa vacunal de la temporada 2016-17 (Figura 6).

El análisis de la susceptibilidad a antivirales inhibidores de la neuraminidasa de 3 de los virus AH3 no ha evidenciado la identificación de mutaciones de resistencia a oseltamivir o zanamivir.

Figura 6. Caracterizaciones genéticas de detecciones de virus de la gripe. Temporada 2016-17. España





Figura 7. Tasa de detección de virus de la gripe y VRS (%). Temporada 2016-17. España



Fuentes: Redes centinela del SVGE. Información de VRS de los laboratorios de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra, La Rioja y Ceuta.

En el periodo de vigilancia se han notificado 160 detecciones de VRS entre las 1.512 muestras analizadas (10%)*. Esta tasa de detección se mantiene en descenso desde la semana 51/2016, cuando se alcanzó la máxima intensidad de circulación de este virus respiratorio (34,3%). Más información sobre la vigilancia de VRS puede consultarse [aquí](#).

*Los datos notificados en semanas previas se actualizan cada semana, por lo que podrían variar en función de la semana de presentación de los informes.

Brotos de gripe


Desde el inicio de la temporada 2016-17 se han notificado 34 brotes de gripe en diez CCAA, entre las semanas 45/2016 y 03/2017, aumentando su frecuencia con el inicio de la onda epidémica gripal. Veintisiete brotes han tenido lugar en instituciones geriátricas, seis en instituciones sanitarias y uno en un centro de personas con discapacidad. En total se estiman 753 casos, de los que 691 (92%) residían en geriátricos. La mediana de edad es de 86 años (RIC: 84-89) en geriátricos y de 58 años (RIC: 51-65) en instituciones sanitarias. De entre los casos notificados asociados a brotes, 137 han requerido hospitalización y 14 han fallecido (todos procedentes de geriátricos). En todos se ha identificado como agente causal el virus de la gripe A (15 A no subtipado y 19 A(H3N2)). El porcentaje de positividad ha sido mayor del 85% en todos los brotes, excepto en dos de ellos.

Vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG)

Desde el inicio de la temporada se han notificado en total 1.994 CGHCG procedentes de 17 CCAA, con la distribución por semana observada en la figura 8. El 53% de los CGHCG son hombres.


En 1.984 pacientes (99,5%) se identificó el virus de la gripe A y en 10 (0,5%) el virus B. Prácticamente todos los virus A subtipados (99,4%) son A(H3N2). En la figura 9 se muestra las detecciones virales en CGHCG por tipo/subtipo de virus y grupo de edad. El mayor número de casos se registra en el grupo de >64 años (75%) seguido del grupo de 45 a 64 años (16%).

Figura 8. Casos graves hospitalizados confirmados de gripe y tasa de gripe. Temporada 2016-17 España




Fuente: CNE. SVGE. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Figura 9. Detecciones virales en casos graves hospitalizados confirmados de gripe por grupo de edad. Temporada 2016-17. España



CNE. SVGE. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Figura 10. Prevalencia de factores de riesgo en CGHCG por grupos de edad. Temporada 2016-17. España



Fuente: CNE. SVGE. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

El 91% de los pacientes con información disponible presentaban factores de riesgo de complicaciones de gripe. En los adultos los factores de riesgo más prevalentes son la enfermedad cardiovascular crónica (47%), la diabetes (32%) y la enfermedad pulmonar crónica (31%), y en los menores de 15 años la enfermedad pulmonar crónica (8%) y la enfermedad cardiovascular crónica (6%) (Figura 10).


El 74% de los pacientes desarrolló neumonía y 442 casos ingresaron en UCI (22,8% de los que tenían información sobre este aspecto). De los 1.642 pacientes pertenecientes a grupos recomendados de vacunación, el 48% no habían recibido la vacuna antigripal de esta temporada.

Defunciones en casos graves hospitalizados confirmados de gripe

Desde el inicio de la temporada 2016-17 se han notificado 249 defunciones entre los CGHCG en 16 CCAA, el 51% en hombres. Todas las defunciones se asocian a virus A [138 A(H3N2), 110 A no subtipado y una A(H1N1)pdm09] (Figura 11). El 84% de los casos eran mayores de 64 años, y el 14% pertenecían al grupo de 45-64 años. El 96% tenía factores de riesgo, y 77 casos (31% de los que tenían información sobre este aspecto) habían ingresado en UCI. Entre los 219 casos susceptibles de vacunación antigripal, el 49% no habían sido vacunados.

La información sobre mortalidad en CGHCG describe las características clínicas, epidemiológicas y virológicas de los CGHCG con una evolución fatal, así como la información sobre los factores de riesgo de evolución grave. Esta aproximación es muy útil para identificar patrones de enfermedad grave y proporcionar información para la adopción de medidas de prevención y control, sin embargo no sirve para cuantificar el impacto de la gripe en la mortalidad de la población. La cuantificación del impacto se realiza con modelos matemáticos que estiman el exceso de mortalidad en periodos de actividad gripal, si bien la disponibilidad de los datos de mortalidad por causas específicas limita las estimaciones a temporadas anteriores.

Figura 11. Defunciones confirmadas de gripe por tipo/subtipo de virus de la gripe y grupo de edad. Temporada 2016-17. España




Excesos de mortalidad semanal por todas las causas

Durante la temporada 2016-2017 el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España incluye las defunciones por todas las causas registradas en 3.826 registros civiles informatizados, que representan el 92% de la población española. Los registros civiles incluidos en el sistema son representativos de todas las áreas climáticas y de todo el territorio nacional. El modelo predictivo desarrollado por MoMo se basa en un modelo restrictivo de medias históricas. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos basados en la mortalidad observada del 1 de enero 2009 al 31 de diciembre 2014 procedente del Instituto Nacional de Estadística. Si bien la fuente de los datos es mortalidad diaria, a efectos de comparación con las tasas semanales de gripe, el resultado del análisis diario se agrega semanalmente para ofrecer un exceso de mortalidad semanal.

La actualización de esta semana identifica un exceso de mortalidad por encima de lo esperado desde la semana 01/2017 hasta la semana actual (Figura 12). El exceso afecta casi exclusivamente a los mayores de 64 años, grupo en el que se estima un 4% de sobremortalidad en la semana 4/2017, y coincide tanto con la fase de ascenso de la epidemia gripal, como con una ola de frío registrada en España en las últimas semanas.

Resultados similares de exceso de mortalidad por todas las causas han sido notificados por otros países de nuestro entorno. Para más información ver EUROMOMO

Figura 12. Mortalidad semanal por todas las causas e incidencia semanal de gripe. España. Hasta semana 05/2017



Situación en Europa:

En la semana 04/2017 la actividad gripal en Europa se mantiene elevada, cinco países señalan una intensidad alta o muy alta. La tasa de detección continúa siendo alta (51%), similar a la de la semana pasada (49%). Tras la pandemia de 2009-10, esta es la temporada en la que se ha alcanzado una tasa de detección del 10% más temprano (semana 46), mientras que en las últimas seis temporadas ocurrió entre las semanas 49 y 51. En esta semana 04/2016, el 95% de las muestras centinela positivas fueron tipo A, siendo A(H3N2) el 97% de los virus subtipados. Una distribución similar a la observada en lo que va de temporada: el 96% de virus tipo A, siendo A(H3N2) el 99% de los virus subtipados. De los 252 virus tipo B que han sido adscritos a un linaje, el 64% eran B/Victoria. Hasta el momento, los virus A(H3N2) circulantes son antigénicamente similares a los de la cepa vacunal de esta temporada. Aunque el 70% de los 927 virus caracterizados genéticamente pertenecen a un nuevo subgrupo genético (3C.2a1), estos virus son antigénicamente similares a la cepa vacunal (grupo 3C.2a).

Respecto a los casos graves hospitalizados confirmados de gripe, desde el inicio de la temporada, República Checa, España, Irlanda, Reino Unido y Rumanía han notificado 2.500 casos hospitalizados sin ingreso en UCI (1.507 infectados con virus tipo A no subtipado, 976 A(H3N2), tres A(H1N1)pdm09 y 14 con tipo B). En total, República Checa, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Rumanía y Suecia han notificado 2.204 casos ingresados en UCI, siendo la distribución similar: el 98% de casos por virus tipo A, siendo el 89% de los subtipados A(H3N2). El 65% eran mayores de 64 años, y el 5% menores de 15. Se notificaron 467 defunciones, siendo el 83% mayores de 65 años. Para más información consultar [ECDC](#)

Situación en el mundo:

La actividad gripal en la zona templada del hemisferio norte continúa incrementándose, especialmente en Europa y Este de Asia, superando el umbral basal de forma más temprana que en temporadas previas. A nivel mundial predomina el virus A(H3N2). En el oeste de Asia desciende la actividad gripal con predominio de A(H3N2) y circulación de virus B. En el sur de Asia se mantiene una baja actividad gripal con predominio de A(H3N2) y escasa circulación de virus A(H1N1)pdm09 y B. En el norte de África circulan los virus A(H3N2) y B y en el oeste se continúa detectando el virus B en Ghana. En América Central y el Caribe se mantiene una escasa actividad gripal y los países del hemisferio sur se mantienen niveles propios de intertemporada. La mayoría de los virus gripales caracterizados hasta el momento son antigénicamente similares a los de la vacuna de la temporada 2016-17 en el hemisferio norte, y los testados recientemente son susceptibles a antivirales inhibidores de la neuraminidasa.

Según la última actualización de FluNet, del 9 al 22 de enero de 2017 el 95% de las detecciones positivas a virus de la gripe fueron tipo A, siendo el 98% de los subtipados A(H3N2). De los virus B caracterizados, el 60% pertenecen al linaje Victoria y el otro 40% a Yamagata. Para más información consultar el último informe publicado por la [OMS](#) el 6 de febrero de 2017.

Estados Unidos: En la semana 04/2017 la actividad gripal aumentó, con una proporción de síndromes gripales en visitas extra-hospitalarias del 3,9% (umbral basal establecido para la temporada, 2,2%), y un porcentaje de muestras positivas del 18,4% (en aumento respecto a la semana previa). El virus tipo A supone el 93% de las detecciones en los laboratorios de Salud Pública, siendo el virus A(H3N2) el más frecuente entre los subtipados (98%). La tasa acumulada de hospitalizaciones confirmadas por laboratorio en la temporada es de 20,3 casos por 100.000 habitantes. Más información en [FluView \(CDC\)](#)

Canadá: En la semana 04/2017 la actividad de varios indicadores, incluidos la tasa de detección de virus de la gripe, los brotes y el nº de hospitalizaciones, descienden o se mantienen estables respecto a la semana previa. Disminuye el nº de detecciones virales (2.586) y se mantiene la tasa de detección (23%) respecto a la semana 03/2017. Continúa el predominio de virus A (98%), y de A(H3N2) entre los subtipados (99%). El 2% de las visitas a profesionales sanitarios son por síndrome gripal, inferior a la semana previa (2,1%). El nº de brotes de gripe confirmados por laboratorio (51), disminuye también respecto a la semana previa. La mayoría de estos brotes tuvieron lugar en instituciones de larga estancia. La mayoría de casos, hospitalizaciones y muertes en Canadá han tenido lugar en el grupo de >64 años. Más información en [FluWatch](#)

Gripe de origen animal A(H5N1): Desde 2003 hasta la actualidad se han notificado a la OMS un total de 856 casos humanos confirmados por laboratorio de gripe aviar A(H5N1), procedentes de 16 países, de los cuales 452 fallecieron. **Gripe de origen animal A(H5N6):** Desde mayo de 2014 hasta la actualidad, 16 casos de infección humana con el virus de la gripe aviar A(H5N6) han sido notificados, incluyendo 6 muertes. Todos los casos procedían de China.

Gripe de origen animal A(H7N9): Desde marzo de 2013, y hasta el 16 de enero de 2017 se han notificado a la OMS un total de 918 casos confirmados por laboratorio, de los cuales al menos 359 han fallecido. **Gripe de origen animal A(H7N2):** Estados Unidos ha notificado a la OMS un caso humano de gripe A(H7N2) confirmado por laboratorio. La posible fuente de infección fue el contacto con un gato infectado con este virus. Los síntomas fueron leves, y el enfermo se recuperó completamente. No se han detectado casos de transmisión de humano a humano. **Gripe de origen animal A(H1N2)v:** desde 2005 se han notificado nueve casos en EUA, la mayoría no requirieron hospitalización. **Gripe de origen animal A(H3N2)v:** el 16 de diciembre Canadá a notificó a la OMS su primer caso confirmado por virus A(H3N2)v. La mayoría de los casos notificados han presentado enfermedad moderada, con alguna hospitalización, y solo una defunción. **Gripe de origen animal A(H9N2):** se han notificado a la OMS 30 casos humano de gripe A(H9N2) confirmado por laboratorio, la mayoría con enfermedad leve y sin evidencia de transmisión entre humanos. Información adicional y última evaluación de riesgo sobre virus de la gripe no estacionales puede consultarse [aquí](#).

Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS): A nivel global, desde septiembre de 2012, la OMS ha recibido la notificación de 1.888 casos confirmados de MERS-CoV procedentes de 27 países, incluyendo al menos 670 defunciones. Hasta el momento actual, ningún caso de MERS-CoV ha sido confirmado en España. Más información de la vigilancia internacional del MERS-CoV puede consultarse [aquí](#).

Nota informativa: la **suscripción a la lista de distribución del Informe semanal de vigilancia de gripe** se puede realizar en la página del SVGE. Las personas suscritas recibirán periódicamente el informe publicado los jueves de cada semana, durante el periodo habitual de vigilancia, y cada dos semanas en el periodo estival. La suscripción se puede realizar a través del siguiente enlace [SVGE](#).

En la elaboración de este Informe ha participado el Grupo de Vigilancia de Gripe, el Grupo de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Área de Vigilancia de la Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología (Instituto de Salud Carlos III) y el Laboratorio de gripe y virus respiratorios del Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III). Este informe es el resultado del trabajo de todos los integrantes del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE): médicos centinela, epidemiólogos de las redes centinela, virólogos de los laboratorios integrados en el SVGE y laboratorios asociados, profesionales de los hospitales participantes en la vigilancia de los casos graves hospitalizados confirmados de gripe, responsables epidemiológicos y virológicos de cada red y coordinadores epidemiológicos y virológicos del SVGE (CNE y CNM, ISCIII). Cualquier pregunta relacionada con este informe debe dirigirse a: CNE-VIGILANCIA-GRYPE@isciii.es, alarrauri@isciii.es, cdelgados@isciii.es o jaoliva@isciii.es

Este informe se puede consultar en la página del [SVGE](#) y en la página del Instituto de Salud Carlos III ([ISCIII](#))

Cita sugerida: Instituto de Salud Carlos III. Informe semanal de Vigilancia de la Gripe en España. Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. Semana 5/2017. Nº 494. 9 de febrero de 2017.