

Informe nº 63. Situación de COVID-19 en España. Casos diagnosticados a partir 10 de mayo

Informe COVID-19 . 27 de enero de 2021



Contenido

Introducción	3
Nota metodológica	3
Casos de COVID-19 en España notificados a la RENAVE con inicio de síntomas y diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020	5
Comparación de los indicadores de gravedad entre los casos notificados antes y después de la entrada en vigor de la nueva Estrategia de Vigilancia y Control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19 (11 de mayo de 2020)	16
Observaciones	17
Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas, MoMo	18

Introducción

En diciembre de 2019 surgió un agrupamiento de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei, China), con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo virus de la familia *Coronaviridae* que posteriormente fue denominado SARS-CoV-2¹. La secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. La enfermedad causada por este nuevo virus se ha denominado por consenso internacional COVID-19. El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) declaró el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en su reunión del 30 de enero de 2020. Posteriormente, la OMS lo reconoció como una pandemia global el 11 de marzo de 2020.

Este informe contiene el análisis de los casos de COVID-19 notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a partir del 11 de mayo de 2020, debido a la entrada en vigor de la nueva Estrategia de Vigilancia y Control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19, a través de la plataforma SiViES (Sistema para la Vigilancia en España), que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología conforme a los criterios establecidos en el protocolo de vigilancia en cada momento. Este informe refleja la información suministrada por las CCAA a la RENAVE. La extracción de datos se ha realizado el **27 de enero de 2021 a las 15:30 h.**

Nota metodológica

Desde el principio de la pandemia de COVID-19, la vigilancia de los casos de esta enfermedad en España se basa en la notificación universal de todos los casos confirmados de COVID-19 que se identifican en cada CCAA. Las CCAA realizan una notificación individualizada de casos de COVID-19 a la RENAVE a través de la plataforma informática vía Web SiViES que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología (CNE). Esta información procede de la encuesta epidemiológica de caso que cada CA cumplimenta ante la identificación de un caso de COVID-19. El contenido de la encuesta se ha ido modificando conforme a las prioridades en cada momento. Inicialmente contenía una mayor cantidad de datos, epidemiológicos y clínicos de los casos de COVID-19 identificados en España. A partir del 11 de mayo de 2020, debido a la entrada en vigor de la nueva Estrategia de Vigilancia y Control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19, hubo un cambio en la notificación de las CCAA al Ministerio de Sanidad, simplificando la encuesta para hacerla más ágil. Los casos confirmados serán de declaración obligatoria urgente al nivel estatal siguiendo la encuesta del Anexo 1 de dicha Estrategia. La encuesta incluye información clínico-epidemiológica consensuada y aprobada por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y la RENAVE.

Para conseguir una información completa de cada caso, la CA debe realizar sucesivas actualizaciones de la información de la encuesta porque no siempre toda la información está disponible desde la identificación del caso, o precisa de una actualización según cambia la evolución clínica del paciente. Las actualizaciones de la información de los casos las realizan las CCAA, según disponen de ellas, en la plataforma SiViES.

Los objetivos actuales de esta vigilancia son:

1. **Conocer la incidencia de la enfermedad de manera consistente** con la evolución de la pandemia y a partir de una fuente única que informe de los casos de COVID-19 en España por nivel de gravedad.

¹ <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>
Situación de COVID-19 en España a 27 de enero de 2021. Equipo COVID-19. RENAVE. CNE. CNM (ISCIII)

2. Obtener los **indicadores** que informarán sobre la situación epidemiológica de la COVID-19 y su distribución geográfica en España.
3. Obtener información oportuna que guíe la respuesta precoz ante la epidemia de COVID-19.

Es importante resaltar que todos los resultados son provisionales y deben interpretarse con precaución, porque se ofrece información de cada variable con la información disponible para cada una de ellas en el momento de la extracción de datos. Estos resultados pueden variar con cada informe por la dinámica propia de declaración de datos por las CCAA a la RENAVE a través de SiViES. En el caso de “hospitalización”, “UCI” y “defunción”, hemos considerado como “no hospitalización”, “no UCI” y “no defunción” los casos sin información en esta variable, y deben ser confirmados en posteriores análisis.

El análisis se ha realizado con todos los casos notificados a la RENAVE con fecha de diagnóstico posterior al 10 de mayo. La fecha utilizada para la presentación de los casos fue la fecha de inicio de síntomas, y en su defecto, la fecha de diagnóstico menos tres días (mediana entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de diagnóstico). En aquellos casos en los que no se dispone de fecha de inicio de síntomas ni de diagnóstico se utiliza la fecha clave (fecha para estadísticas). En los casos asintomáticos se ha utilizado la fecha de diagnóstico.

Casos de COVID-19 en España notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020

Tabla 1. Incidencia acumulada en las tres últimas semanas epidemiológicas y razón de tasas semanales por grupos de edad. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020

Grupo de edad	Nº casos	Semana 1/2021		Semana 2/2021		Semana 3/2021*		Razón de tasas semanales (IC95%)	
		N	IA	N	IA	N	IA	Semana 2/1	Semana 3/2*
<15	288923	16401	238,5	25162	365,9	26766	389,2	1,53 (1,50-1,56)	1,06 (1,05-1,08)
15-29	490157	37729	517,0	41888	574,0	32228	441,7	1,11 (1,09-1,13)	0,77 (0,76-0,78)
30-39	345266	24970	409,1	29806	488,4	24311	398,3	1,19 (1,17-1,21)	0,82 (0,80-0,83)
40-49	409905	29273	373,7	36104	460,9	31081	396,8	1,23 (1,21-1,25)	0,86 (0,85-0,87)
50-59	360776	27610	392,5	34689	493,1	28454	404,5	1,26 (1,24-1,28)	0,82 (0,81-0,83)
60-69	227324	17068	319,0	22453	419,6	18371	343,3	1,32 (1,29-1,34)	0,82 (0,80-0,83)
70-79	145240	10442	262,1	14012	351,7	11976	300,6	1,34 (1,31-1,38)	0,85 (0,83-0,88)
≥80	168289	10215	358,3	14381	504,4	13112	459,9	1,41 (1,37-1,44)	0,91 (0,89-0,93)
Total	2435880	173708	367,0	218495	461,6	186299	393,6	1,26 (1,25-1,27)	0,85 (0,85-0,86)

Casos por fecha de inicio de síntomas y en su ausencia fecha de diagnóstico menos 3 días, por grupo de edad y semana (última, penúltima y antepenúltima). IA: incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes). *Los datos de las dos últimas semanas (número de casos, incidencia acumulada y razón de tasas), especialmente de la última semana, pueden no estar consolidados debido a diferentes aspectos relacionados con la dinámica de declaración a la RENAVE, y pueden variar en futuros informes.


Tabla 2. Incidencia acumulada en las tres últimas semanas epidemiológicas y razón de tasas semanales por CCAA. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020

Comunidad autónoma	Nº casos	Semana 1/2021		Semana 2/2021		Semana 3/2021*		Razón de tasas semanales (IC95%)	
		N	IA	N	IA	N	IA	Semana 2/1	Semana 3/2*
Andalucía	366914	24823	292,8	36269	427,8	38280	451,5	1,46 (1,44-1,48)	1,06 (1,04-1,07)
Aragón	89866	3684	276,9	4905	368,7	4170	313,5	1,33 (1,28-1,39)	0,85 (0,82-0,89)
Asturias	31847	1533	150,5	2239	219,7	2417	237,2	1,46 (1,37-1,56)	1,08 (1,02-1,14)
Baleares	48551	4591	379,2	4368	360,8	2724	225,0	0,95 (0,91-0,99)	0,62 (0,59-0,65)
Canarias	32004	1847	82,6	2084	93,2	1695	75,8	1,13 (1,06-1,20)	0,81 (0,76-0,87)
Cantabria	19680	1076	184,8	1105	189,7	1003	172,2	1,03 (0,94-1,12)	0,91 (0,83-0,99)
Castilla-La Mancha	126726	11493	478,6	14290	595,1	9999	416,4	1,24 (1,21-1,27)	0,70 (0,68-0,72)
Castilla y León	160040	9521	465,4	16643	813,6	15607	763,0	1,75 (1,70-1,79)	0,94 (0,92-0,96)
Cataluña	428833	23544	307,7	25348	331,2	20546	268,5	1,08 (1,06-1,10)	0,81 (0,80-0,83)
C. Valenciana	272119	33558	667,2	42592	846,9	29154	579,7	1,27 (1,25-1,29)	0,68 (0,67-0,69)
Extremadura	59448	7727	727,6	8246	776,5	5479	515,9	1,07 (1,03-1,10)	0,66 (0,64-0,69)
Galicia	80851	6234	230,7	9452	349,7	9712	359,4	1,52 (1,47-1,57)	1,03 (1,00-1,06)
Madrid	436726	26925	399,1	30213	447,8	28950	429,1	1,12 (1,10-1,14)	0,96 (0,94-0,97)
Murcia	93021	10174	676,1	11963	795,0	7549	501,6	1,18 (1,15-1,21)	0,63 (0,61-0,65)
Navarra	42396	1187	180,8	1548	235,8	1500	228,5	1,30 (1,21-1,41)	0,97 (0,90-1,04)
País Vasco	116918	3859	176,3	4592	209,8	5251	239,9	1,19 (1,14-1,24)	1,14 (1,10-1,19)
La Rioja	20537	1466	464,0	2051	649,2	1633	516,9	1,40 (1,31-1,50)	0,80 (0,75-0,85)
Ceuta	3716	179	212,9	191	227,2	238	283,1	1,07 (0,87-1,31)	1,25 (1,03-1,51)
Melilla	5687	287	339,7	396	468,8	392	464,0	1,38 (1,19-1,61)	0,99 (0,86-1,14)
Total	2435880	173708	367,0	218495	461,6	186299	393,6	1,26 (1,25-1,27)	0,85 (0,85-0,86)

Casos por fecha de inicio de síntomas y en su ausencia fecha de diagnóstico menos 3 días, por grupo de edad y semana (última, penúltima y antepenúltima). IA: incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes). *Los datos de las dos últimas semanas (número de casos, incidencia acumulada y razón de tasas), especialmente de la última semana, pueden no estar consolidados debido a diferentes aspectos relacionados con la dinámica de declaración a la RENAVE, y pueden variar en futuros informes.


Figura 1. Incidencia acumulada en los últimos 14 días por CCAA y total España. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020

Figura 1a



Los datos de las últimas semanas, especialmente de la última semana, no están consolidados debido a diferentes aspectos relacionados con la dinámica de declaración a la RENAVE. La línea roja discontinua indica los días en los que se estima una posible variación del 10% entre la IA calculada con los datos disponible hasta el momento y la real. La variación del 10% se ha estimado analizando el número de días que transcurren entre la notificación del caso a la CCAA y la fecha de inicio de síntomas, utilizando extracciones de SiVIES de los últimos 15 días. En ausencia de fecha de inicio de síntomas, se usa la fecha de diagnóstico menos 3 días, en los casos sintomáticos, y la fecha de diagnóstico, en los casos asintomáticos.

Figura 1b



Los datos de las últimas semanas, especialmente de la última semana, no están consolidados debido a diferentes aspectos relacionados con la dinámica de declaración a la RENAVE. La línea roja discontinua indica los días en los que se estima una posible variación del 10% entre la IA calculada con los datos disponible hasta el momento y la real. La variación del 10% se ha estimado analizando el número de días que transcurren entre la notificación del caso a la CCAA y la fecha de inicio de síntomas, utilizando extracciones de SiViES de los últimos 15 días. En ausencia de fecha de inicio de síntomas, se usa la fecha de diagnóstico menos 3 días, en los casos sintomáticos, y la fecha de diagnóstico, en los casos asintomáticos.

Tabla 3. Casos de COVID-19 por nivel de gravedad notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020. Distribución por CCAA y total España

Comunidad Autónoma	Casos totales	Hospitalizados ¹	UCI ¹	Defunciones ¹
Andalucía	366914	21705 (5,9)	1945 (0,5)	4653 (1,3)
Aragón	89866	8351 (9,3)	640 (0,7)	1992 (2,2)
Asturias	31847	4698 (14,8)	294 (0,9)	1142 (3,6)
Baleares	48551	2609 (5,4)	367 (0,8)	333 (0,7)
Canarias	32004	2675 (8,4)	475 (1,5)	349 (1,1)
Cantabria	19680	1848 (9,4)	232 (1,2)	237 (1,2)
Castilla-La Mancha	126726	5221 (4,1)	449 (0,4)	1433 (1,1)
Castilla y León	160040	13177 (8,2)	1012 (0,6)	2723 (1,7)
Cataluña	428833	14526 (3,4)	1071 (0,2)	2733 (0,6)
C. Valenciana	272119	17445 (6,4)	1353 (0,5)	2976 (1,1)
Extremadura	59448	3547 (6,0)	300 (0,5)	875 (1,5)
Galicia	80851	6672 (8,3)	850 (1,1)	1034 (1,3)
Madrid	436726	18729 (4,3)	961 (0,2)	3821 (0,9)
Murcia	93021	6521 (7,0)	823 (0,9)	852 (0,9)
Navarra	42396	2618 (6,2)	274 (0,6)	488 (1,2)
País Vasco	116918	5108 (4,4)	482 (0,4)	1761 (1,5)
La Rioja	20537	1760 (8,6)	209 (1,0)	268 (1,3)
Ceuta	3716	232 (6,2)	24 (0,6)	64 (1,7)
Melilla	5687	356 (6,3)	57 (1,0)	47 (0,8)
Total España	2435880	137798 (5,7)	11818 (0,5)	27781 (1,1)

¹ n (%) calculado sobre el total de casos en cada CCAA

Tabla 4. Casos de COVID-19 por nivel de gravedad notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020. Distribución por grupo de edad

Grupo de edad (años)	Casos totales N	Hospitalizados ¹ N (%)	UCI ¹ N (%)	Defunciones ¹ N (%)
<2	28177	587 (2,1)	19 (0,1)	13 (0,0)
2-4	43717	199 (0,5)	10 (0,0)	1 (0,0)
5-14	217029	698 (0,3)	41 (0,0)	8 (0,0)
15-29	490157	3821 (0,8)	202 (0,0)	47 (0,0)
30-39	345266	6272 (1,8)	429 (0,1)	81 (0,0)
40-49	409905	12498 (3,0)	1100 (0,3)	281 (0,1)
50-59	360776	19403 (5,4)	2369 (0,7)	911 (0,3)
60-69	227324	23672 (10,4)	3585 (1,6)	2401 (1,1)
70-79	145240	26932 (18,5)	3221 (2,2)	5435 (3,7)
≥80	168289	43716 (26,0)	842 (0,5)	18603 (11,1)
Total	2435880	137798 (5,7)	11818 (0,5)	27781 (1,1)

¹ n (%) calculado sobre el total de casos en cada grupo de edad

Tabla 5. Características demográficas, clínicas y antecedentes epidemiológicos de riesgo. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE* con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020

Características	Total	Mujeres n (%)	Hombres n (%)	p-valor
Sexo		1279939 (52,5)	1154001 (47,4)	
Mediana de edad (rango)	42 (25-57)	42 (25-58)	41 (24-56)	<0,001
Grupo de edad (años)				
	<2	28177 (1,2)	13498 (1,1)	14657 (1,3)
	2-4	43717 (1,8)	21652 (1,7)	22007 (1,9)
	5-14	217029 (8,9)	106616 (8,3)	110239 (9,6)
	15-29	490157 (20,1)	252580 (19,7)	237365 (20,6)
	30-39	345266 (14,2)	183583 (14,3)	161482 (14,0)
	40-49	409905 (16,8)	216012 (16,9)	193668 (16,8)
	50-59	360776 (14,8)	189558 (14,8)	170956 (14,8)
	60-69	227324 (9,3)	113989 (8,9)	113127 (9,8)
	70-79	145240 (6,0)	75703 (5,9)	69401 (6,0)
	≥80	168289 (6,9)	106748 (8,3)	61099 (5,3)
Síntomas	1250524 (55,9)	666818 (56,6)	583584 (55,0)	<0,001
Personal sanitario y sociosanitario	66011 (4,5)	51645 (6,7)	14354 (2,1)	<0,001
Personal sanitario que trabaja en*				
	Centro sanitario	41755 (63,3)	31821 (61,6)	9931 (69,2)
	Centro sociosanitario	18282 (27,7)	15560 (30,1)	2718 (18,9)
	Otros centros	5974 (9,1)	4264 (8,3)	1705 (11,9)
Número de contactos estrechos identificados*	2 (1- 4)	2 (1- 4)	2 (1- 4)	<0,001
Ámbito de posible exposición*				
	Centro sociosanitario	63727 (4,1)	42273 (5,2)	21446 (3,0)
	Laboral	83469 (5,4)	42594 (5,3)	40807 (5,6)
	Centro sanitario	31017 (2,0)	19063 (2,4)	11951 (1,6)
	Domicilio	537097 (35,0)	285306 (35,2)	251766 (34,7)
	Escolar	24859 (1,6)	12897 (1,6)	11962 (1,6)
	Social^	22976 (1,5)	11608 (1,4)	11368 (1,6)
	Otros	152178 (9,9)	77549 (9,6)	74620 (10,3)
	Desc	620899 (40,4)	318913 (39,4)	301950 (41,6)
Importado	5676 (0,3)	2294 (0,2)	3380 (0,4)	<0,001
Prueba de laboratorio*				
	Desconocida	696 (0,0)	365 (0,0)	329 (0,0)
	PCR/Técnicas moleculares	1965468 (80,7)	1036582 (81,0)	927095 (80,3)
	Test rápido de anticuerpos	260 (0,0)	142 (0,0)	118 (0,0)
	Detección de antígeno	465800 (19,1)	240435 (18,8)	225218 (19,5)
	ELISA	3656 (0,2)	2415 (0,2)	1241 (0,1)

*Se contabiliza solo una técnica diagnóstica por caso. Cuando a un individuo se le han realizado varias técnicas diagnósticas, se contabilizará solo aquella que sea considerada más específica y sensible, en este orden: 1º PCR y otras técnicas moleculares, 2º prueba rápida de detección de antígeno, 3º detección de anticuerpos por ELISA o equivalente, 4º prueba rápida de detección de anticuerpos

^La categoría de posible exposición "social" ha sido introducida a partir de la semana 46/2020, estando estos casos previamente englobados en "otros"

Tabla 6a. Principales indicadores: síntomas, tiempo entre eventos y contactos, por Comunidad Autónoma y total España, Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020

Comunidad Autónoma	Presencia de síntomas ¹	Tiempo entre eventos (días) ²					Casos sin contacto conocido con COVID ¹	Contactos identificados por caso ²
		Síntomas hasta consulta	Síntomas hasta diagnóstico	Síntomas hasta aislamiento	Consulta hasta diagnóstico	Consulta hasta aislamiento		
Andalucía	154464 (42,1)	2 (0-3)	3 (1-5)	0 (-2-2)	0(0-2)	0 (0-0)	58196 (25,4)	2 (1-4)
Aragón	63152 (71,0)	2 (0-4)	3 (1-5)	1 (0-2)	1(0-3)	0 (-2-0)	24152 (29,3)	2 (1-4)
Asturias	4202 (81,7)	1 (0-2)	2 (1-4)	1 (0-2)	1(1-2)	0 (-1-0)	2101 (19,3)	3 (2-6)
Baleares	38601 (79,5)	1 (0-3)	2 (1-4)	1 (1-1)	0(0-2)	0 (0-0)	25409 (52,3)	11 (11-11)
Canarias	21073 (68,1)	1 (0-3)	3 (2-5)	1 (0-3)	2(1-3)	0 (0-0)	4479 (16,8)	1 (0-4)
Cantabria	12475 (94,7)	1 (0-2)	3 (2-4)	2 (1-4)	2(1-4)	2 (0-3)	6103 (32,5)	2 (0-4)
Castilla-La Mancha	76837 (60,6)	1 (0-3)	3 (1-5)	1 (0-3)	2(0-3)	0 (0-1)	38452 (30,3)	0 (0-1)
Castilla y León	88317 (65,0)	2 (0-3)	2 (1-4)	1 (0-3)	1(0-2)	0 (-1-0)	29086 (26,0)	2 (0-3)
Cataluña	227901 (53,1)	3 (1-5)	2 (1-4)	1 (0-2)	-1(-2-0)	-2 (-4-0)	240707 (56,1)	3 (2-4)
C. Valenciana	149560 (55,0)	1 (0-3)	3 (1-5)	1 (0-2)	1(0-3)	0 (-1-0)	43432 (24,5)	3 (2-4)
Extremadura	27197 (55,4)	2 (1-3)	2 (1-4)	1 (0-2)	0(0-0)	0 (-3-0)	9324 (18,0)	2 (0-4)
Galicia	47144 (78,9)	2 (1-3)	3 (1-4)	1 (0-3)	0(0-1)	0 (-1-0)	32446 (40,1)	2 (0-4)
Madrid	219377 (50,2)	2 (0-4)	3 (1-5)	1 (0-3)	1(0-2)	0 (-2-1)	39759 (35,1)	3 (2-4)
Murcia	63468 (70,5)	1 (0-3)	3 (1-5)	0 (0-2)	1(0-2)	0 (-1-1)	23049 (25,6)	3 (2-5)
Navarra	27914 (65,8)	2 (1-4)	3 (2-5)	2 (1-3)	0(0-1)	0 (0-0)	13803 (32,6)	2 (0-4)
País Vasco	7958 (55,1)	1 (0-2)	3 (1-5)	1 (0-2)	1(0-2)	0 (0-0)	751 (8,8)	4 (1-5)
La Rioja	13671 (70,2)	2 (1-4)	3 (2-5)	1 (0-3)	0(0-2)	0 (-3-0)	3770 (19,5)	3 (1-4)
Ceuta	3085 (83,0)	2 (1-4)	4 (2-6)	2 (0-4)	0(0-2)	0 (-2-0)	1384 (37,2)	3 (1-5)
Melilla	4128 (72,6)	2 (1-5)	4 (2-7)	1 (0-3)	1(0-2)	0 (-3-0)	2465 (43,3)	2 (0-5)
Total España	1250524 (55,9)	2 (0-4)	2 (1-5)	1 (0-3)	1 (0-2)	0 (-2-0)	598868 (35,7)	2 (1-4)

¹ n (%) calculado sobre el total de casos con información en esa variable. ² mediana (rango intercuartil).

Tabla 6b. Principales indicadores: síntomas, tiempo entre eventos y contactos, por Comunidad Autónoma y total España, Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico en las últimas 3 semanas epidemiológicas.

Comunidad Autónoma	Presencia de síntomas ¹	Tiempo entre eventos (días) ²					Casos sin contacto conocido con COVID ¹	Contactos identificados por caso ²
		Síntomas hasta consulta	Síntomas hasta diagnóstico	Síntomas hasta aislamiento	Consulta hasta diagnóstico	Consulta hasta aislamiento		
Andalucía	11345 (59,0)	2 (1-3)	2 (1-4)	0 (-2-2)	0(0-1)	0 (0-0)	4625 (28,2)	2 (1-4)
Aragón	3498 (81,8)	1 (0-3)	2 (1-4)	0 (-1-2)	0(0-2)	0 (-1-0)	1138 (26,6)	2 (1-4)
Asturias	185 (93,9)	2 (0-3)	2 (1-3)	1 (0-2)	0(0-1)	0 (-1-0)	86 (10,2)	2 (1-4)
Baleares	7231 (82,5)	2 (0-3)	2 (1-4)	-	0(0-1)	-	3975 (45,3)	-
Canarias	2758 (68,8)	1 (0-3)	3 (1-5)	1 (0-2)	1(0-3)	0 (0-0)	596 (16,9)	1 (0-4)
Cantabria	986 (100,0)	0 (-1-2)	2 (1-4)	2 (0-3)	2(1-4)	2 (0-3)	451 (30,2)	2 (0-4)
Castilla-La Mancha	7198 (67,1)	1 (0-3)	3 (1-5)	1 (0-3)	1(0-3)	0 (0-1)	3133 (29,2)	0 (0-2)
Castilla y León	4069 (75,1)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-2)	0(0-1)	0 (-1-0)	1134 (23,0)	3 (1-4)
Cataluña	24989 (55,8)	2 (1-4)	2 (1-3)	1 (0-2)	0(-1-0)	-1 (-3-0)	29908 (66,8)	3 (2-4)
C. Valenciana	22015 (63,3)	1 (0-3)	3 (1-4)	1 (0-2)	1(0-2)	0 (-1-0)	5911 (23,3)	3 (2-4)
Extremadura	3794 (67,1)	2 (1-4)	2 (1-4)	1 (0-2)	0(0-0)	0 (-3-0)	1067 (18,7)	2 (0-4)
Galicia	4604 (73,7)	2 (1-3)	2 (1-4)	1 (0-3)	0(0-1)	0 (-2-0)	2237 (29,8)	3 (1-5)
Madrid	22512 (66,8)	1 (0-3)	2 (1-4)	1 (0-2)	1(0-1)	0 (-2-1)	4166 (31,9)	3 (2-4)
Murcia	3070 (72,6)	1 (0-3)	2 (1-4)	0 (0-2)	1(0-1)	0 (-1-1)	1169 (27,6)	4 (2-5)
Navarra	1300 (68,3)	2 (1-3)	2 (1-4)	2 (1-3)	0(0-0)	0 (0-0)	476 (25,0)	2 (0-3)
País Vasco	482 (53,3)	1 (-4-2)	1 (0-5)	0 (0-1)	2(0-117)	0 (-1-0)	52 (8,0)	-
La Rioja	858 (74,2)	1 (0-3)	3 (2-5)	0 (0-2)	1(0-3)	0 (-1-0)	119 (11,5)	3 (2-6)
Ceuta	113 (76,9)	3 (1-4)	3 (1-4)	2 (0-3)	0(0-0)	0 (-1-0)	51 (34,7)	3 (0-5)
Melilla	166 (56,5)	2 (1-4)	2 (1-5)	2 (0-4)	0(0-0)	0 (0-0)	130 (44,2)	1 (0-4)
Total España	121173 (64,7)	2 (0-3)	2 (1-4)	1 (0-2)	0 (0-0)	0 (-2-0)	60424 (38,8)	3 (1-4)

¹ n (%) calculado sobre el total de casos con información en esa variable. ² mediana (rango intercuartil). Sobre los casos notificados las últimas 3 semanas epidemiológicas (semanas 1, 2 y 3 de 2021).

Figura 2. Distribución por edad y sexo, Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020 y población española






Figura 3. Curva epidémica de casos de COVID-19 según gravedad, Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020



Los casos diarios están representados con la fecha de inicio de síntomas y en su ausencia la de diagnóstico menos tres días; en los casos asintomáticos se utiliza la fecha de diagnóstico. Los casos hospitalizados están representados por fecha de hospitalización, los casos UCI por fecha de admisión en UCI y las defunciones por fecha de defunción. Fuente: CNE. RENAVE. Los datos de la última semana podrían estar afectados por retraso en la notificación, por lo que la evolución de los últimos días debe ser interpretada con cautela.

Figura 4. Distribución del número de casos por grupos de edad y situación clínica, Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020



Fuente: CNE. ISCIII. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Figura 5. Porcentaje de casos según presencia de síntomas, por Comunidad Autónoma y total España. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020




Figura 6a. Distribución porcentual de casos por CCAA y técnica diagnóstica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020




Figura 6b. Distribución porcentual de casos por CCAA y técnica diagnóstica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con fecha de diagnóstico a partir del 25 de septiembre.




Figura 7. Distribución porcentual de profesionales sanitarios por CCAA. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020




Figura 8. Distribución porcentual por centro de ocupación de los casos en personal sanitario y por CCAA. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020






Figura 9. Distribución porcentual de casos por CCAA y ámbito de exposición. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020



^La categoría de posible exposición "social" ha sido introducida a partir de la semana 46/2020, estando estos casos previamente englobados en "otros"


Comparación de los indicadores de gravedad entre los casos notificados antes y después de la entrada en vigor de la nueva Estrategia de Vigilancia y Control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19 (11 de mayo de 2020)

Hospitalizaciones




- a Porcentaje de hospitalizados a partir del 11 de mayo calculado sobre todos los casos diagnosticados a partir del 11 de mayo
- b Porcentaje de hospitalizados a partir del 11 de mayo calculado solo sobre los casos con síntomas a partir del 11 de mayo

Ingreso en UCI entre los casos hospitalizados



Defunción entre los casos hospitalizados



Observaciones

- En el análisis de los casos notificados a la RENAVE con fecha de diagnóstico posterior al 10 de mayo, y hasta las 15:30 h del 27 de enero de 2021, se identifican 2.435.880 casos de COVID-19 en España. Un 5,7% de los casos han sido hospitalizados, un 0,5% han sido admitidos en UCI y un 1,1% han fallecido.
- La mayor proporción de casos de COVID-19 se producen en el grupo de 15 a 59 años (66% del total), siendo el grupo de 15-29 años el más representado, con un 20.5% de los casos.
- El porcentaje de hospitalizaciones y defunciones con COVID-19 aumenta con la edad, alcanzando un 26% y 11.1% en mayores de 79 años, respectivamente.
- A nivel nacional, entre las semanas 01/2021 (4 - 10 de enero) y 02/2021 (11 - 17 de enero), la incidencia semanal acumulada de COVID-19 aumenta un 26%. El mayor ascenso se produce en los menores de 15 años (53%) y en los mayores de 80 años (41%).
- Por CCAA, en la semana 02/2021 se observa una tasa acumulada semanal por encima de 500 casos/100.000 h en Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia y La Rioja, y entre 250 y 500 casos/100.000 h en Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Madrid y Melilla. En relación a la tendencia, entre las semanas 01 y 02/2021 se observa un ascenso significativo de esta incidencia en prácticamente todas las CCAA, siendo este ascenso mayor en Castilla y León (incremento del 75%), Galicia (52%), Andalucía (46%), Asturias (46%) y La Rioja (40%).
- El 52,5% de los casos de COVID-19 son mujeres y la mediana de edad de los casos es de 42 años, siendo mayor en mujeres que en hombres (42 vs 41 años).
- Con respecto a la distribución por sexo y edad de la población española, los casos de COVID-19, están sobrerrepresentados en los hombres de 15-34 años, en mujeres de 15-54 años y en mayores de 84 años para ambos sexos, especialmente en mujeres.
- El 55,9% de los casos presentó síntomas.
- El 80,7% de los diagnósticos se realizaron con técnicas de PCR, y un 19,1% por técnicas rápidas de detección de antígeno, con diferencias entre las distintas CCAA.
- Un 35,7% no refería contacto conocido con un caso diagnosticado de COVID-19, porcentaje que asciende al 38,8% al restringir el análisis a las últimas tres semanas epidemiológicas.
- El ámbito más frecuente de exposición se da en el entorno del domicilio (35%).
- Un 4,6% de los casos son personal sanitario o sociosanitario, siendo significativamente mayor este porcentaje entre las mujeres que entre los hombres (6.9% vs 2,1%). El 78% del personal sanitario o sociosanitario con COVID-19, notificado desde el 11 de mayo, son mujeres.
- El porcentaje de casos importados es de 0,3%.
- En el análisis del tiempo transcurrido entre los distintos eventos, se observa que la mediana de tiempo entre el inicio de síntomas y el primer contacto con el sistema sanitario es de 2 días (RIC: 0-4 días), hasta el diagnóstico es de 2 (RIC: 1-5) y hasta el aislamiento de 1 días (RIC: 0-3). A nivel nacional estos valores se reducen ligeramente cuando el análisis se restringe a los casos diagnosticados en las tres últimas semanas epidemiológicas.
- Desde el 11 de mayo se estima una mediana de 2 contactos (RIC: 1-4) identificados por caso, con un ligero aumento, 3 (RIC: 1-4), al analizar los datos de las últimas tres semanas epidemiológicas.
- En la comparación de los indicadores de gravedad entre los casos notificados antes y después del 11 de marzo, se observa que:

- El porcentaje de hospitalización aumenta con la edad en ambos periodos, pero es menor en todos los grupos de edad después del 11 de mayo, en consonancia con una mayor capacidad diagnóstica en el segundo periodo, de forma que el porcentaje de casos con criterio de ingreso es menor. El porcentaje de hospitalización a partir del 11 de mayo es mayor cuando en el análisis se tiene en cuenta sólo los casos sintomáticos que cuando se analiza el total de casos. La distribución por grupos de edad es similar en ambos periodos, excepto en el grupo de menores de 15 años, probablemente porque en el primer período se realizó test diagnóstico mayoritariamente a los casos más graves, mientras que en el segundo se ha realizado a gran número de niños sin criterios de gravedad. Los mayores de 80 años presentan el porcentaje de ingreso más alto, en relación al resto de grupos de edad, en el segundo período pero no en el primero.
- El porcentaje y distribución por grupo de edad de los casos ingresados en UCI entre los hospitalizados es similar en ambos periodos, aunque ligeramente inferiores en el segundo.
- La distribución del porcentaje de defunciones entre los casos hospitalizados es similar en ambos periodos, si bien los porcentajes son inferiores en todos los grupos de edad en el segundo periodo. Esto, junto lo observado en el caso de ingreso en UCI, podría indicar una mayor capacidad de ingreso en el segundo período, aceptando para su ingreso pacientes menos graves de entrada.

Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas, MoMo

MoMo es un sistema de vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas que proporciona información sobre el impacto en la mortalidad de la población de todo evento que pueda suponer una amenaza para la Salud Pública, Sus resultados pueden apoyar las evaluaciones de riesgo de dichos eventos y contribuir a guiar adecuadamente la respuesta de salud pública y el desarrollo de políticas de control,

Mediante el sistema MoMo, el Centro Nacional de Epidemiología estima los excesos de mortalidad por todas las causas por sexo y grupos de edad y a nivel nacional y por CCAA, Los resultados son estimaciones de exceso de defunciones por todas las causas, es decir, son excesos de defunciones de carácter inespecífico que no se pueden atribuir directamente a una causa determinada,

Por otra parte, en el momento actual observamos un retraso en la notificación de defunciones en los registros civiles de varias CCAA, por lo que los resultados deben interpretarse con precaución, especialmente en los últimos días y siempre deben ser confirmados con el análisis de los próximos días,

Las estimaciones de MoMo pueden consultarse aquí: [Informes MoMo 2020](#)