



MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES



Informe epidemiológico sobre la situación de la Toxoplasmosis congénita en España

Año 2024

**Resultados de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(RENAVE)**

Informe actualizado el 4 de diciembre de 2025 con los datos disponibles hasta la fecha.

Vigilancia y notificación de los casos:

Unidades de Vigilancia de Salud Pública de las Comunidades Autónomas

Depuración, validación y análisis de los datos:

Unidad de zoonosis. Área de Análisis en Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII.

Área de Vigilancia de Salud Pública. Equipo SiViEs. Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII.

Cita sugerida: Informe epidemiológico sobre Toxoplasmosis congénita en España. Año 2024.
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III.

Introducción

La toxoplasmosis es una zoonosis sistémica causada por el protozoo *Toxoplasma gondii*.

Cuando una mujer se infecta por primera vez durante la gestación, es posible la transmisión transplacentaria y la infección por toxoplasmosis congénita (TC) al feto. La probabilidad de transmisión del parásito aumenta con los meses de gestación, pero, por el contrario, la gravedad de los síntomas es mayor cuanto más precoz es la infección. La afectación fetal puede ser grave, provocando aborto o causando daño en el sistema nervioso central y secuelas neurológicas, psicomotoras, u oculares que pueden manifestarse meses o incluso años después del nacimiento.

Métodos

Este informe describe los casos no importados notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) en el año 2024, dentro del contexto 2021-2024. Se considera caso autóctono el caso cuya variable "importado" consta como no importado o en blanco. Para el cálculo de las tasas de notificación se ha utilizado la población de residentes menores de 1 año (10.000 nacidos vivos) proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.

Situación epidemiológica

Características de los casos

En 2024 se notificaron 8 casos confirmados de TC en todo el territorio de España (7 casos autóctonos y uno importado). Los 7 casos autóctonos suponen una tasa de notificación de 0,22 por 10.000 nacidos vivos. Este constituye el mayor número de casos anuales notificados a la Red desde que la enfermedad se catalogó como enfermedad de declaración obligatoria (EDO).

Entre 2021 y 2024, se notificaron 17 casos autóctonos en total, con una tasa promedia anual de 0,13 por 10.000 nacidos vivos.

En 2024, 1 (14%) caso fue mujer y 6 (86%) hombres. En los años previos (2021-2023), se notificaron un total de 5 casos en mujeres (50%) y 5 en hombres (50%).


Las autonomías que notificaron casos en 2024 fueron: Comunidad Valenciana (2 casos, TN= 0,56 por 10.000) y 1 caso cada una en Islas Baleares (TN=1,15), Canarias (TN=0,84), Cataluña (TN=0,18), Galicia (TN=0,71) y Comunidad de Madrid (TN=0,20).

En el trienio previo (2021-2023) los casos fueron notificados por Comunidad Valenciana (4 casos), Comunidad de Madrid (2 casos), y Andalucía, Canarias, Cataluña y Comunidad Foral de Navarra (1 caso cada una de ellas) y se registraron principalmente en 2023 (6 casos del total en ese año). En los últimos 4 años (2021-2024), el 33% (6/18) de los casos fueron de la Comunidad Valenciana.

Evolución temporal

Tras el año 2020 (sin notificación de casos durante la pandemia), el número de casos y la tasa de incidencia han ido aumentando progresivamente cada año. En 2021 se notificó un único caso (en la Comunidad Valenciana), incrementándose hasta alcanzar los 7 casos confirmados autóctonos en 2024. La evolución temporal de esta EDO desde 2021 se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Número de casos anuales de toxoplasmosis congénita por sexo y tasa de notificación por 10.000 nacidos vivos. España. Años 2021-2024. Fuente RENAVE



Comentario

La toxoplasmosis congénita es una zoonosis grave, capaz de ocasionar importantes secuelas neurológicas y oculares en un feto infectado durante la gestación. La prevención y diagnóstico durante el embarazo constituye el mejor método para evitar la aparición de secuelas incapacitantes durante la infancia o adolescencia.

Actualmente la TC sigue siendo una infección poco frecuente en España y en Europa, aunque en 2024 se observó un incremento en el número de casos notificados al sistema de vigilancia.