

Vigilancia de la gripe en España. Intertemporada 2008. Semanas 31-32/2008. (Periodo de vigilancia: del 27 de julio al 9 de agosto de 2008)


Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio:

En el periodo de vigilancia de las semanas 31-32/2008 no se ha notificado ningún aislamiento de virus de la gripe. Desde el inicio de la Intertemporada 2008, semanas 21-32/2008, se han notificado un total de 14 aislamientos no centinela de virus de la gripe, 13 B (93%) y 1 A (7%) no subtipado distribuidos en Andalucía (3), Aragón (1), Asturias (2), Baleares (4), Cataluña (1), Madrid (1), Navarra (1) y País Vasco (1).

El aislamiento de virus de la gripe B, notificado en la semana 26/2008 por el Laboratorio del Hospital N^º Sr^a de Covadonga de Oviedo (Hospital Central de Asturias), procedía de una niña de 10 meses y corresponde a un virus B/Ohio/1/2006, perteneciente al linaje B/Victoria. La vacuna recomendada para la temporada 2009-2009 incluye un virus B/Florida/4/2006, perteneciente al linaje B/Yamagata.

Figura. Aislamientos de virus de la gripe por tipo/subtipo. Intertemporada 2008.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

Las detecciones de virus de la gripe son en la actualidad esporádicas en Europa. En las semanas 30-31/2008, se detectaron seis virus de la gripe, todos en muestras no centinela: en la semana 30/2008, un virus de la gripe A en Inglaterra y en la semana 31/2008, un virus de la gripe A en Polonia y tres virus de la gripe A y uno B, en Inglaterra. Se observa un incremento de la proporción de virus de la gripe A

Desde la semana 21/2008 se han detectado en Europa un total de 107 virus de la gripe: 79 (74%) de virus B y 28 (26%) de virus A. Desde la semana 16/2008 no se ha registrado ninguna actividad gripal inusual a nivel de comunidad.