

## Actualización de datos del Registro Estatal de Lepra, año 2022 Datos a 31/12/2022

Durante el año 2022 se notificaron al Registro Estatal de Lepra 10 casos incidentes (casos nuevos). La clínica fue multibacilar en 7 casos y paucibacilar en 3 casos. El tratamiento utilizado en 7 casos fue la multiterapia recomendada por la Organización Mundial de la Salud, en 2 casos Otra Terapia y 1 caso Monoterapia. En la distribución por sexo se observaron 7 mujeres y 3 hombres.

De los 10 casos, en 8 constaba un país de contagio distinto de España: Brasil (2), Colombia (1), Indonesia (1), G. Ecuatorial (1), Marruecos (1), Venezuela (1) y Senegal (1).

### Incidencia de lepra por grupos de edad y sexo, año 2022 Registro Estatal de Lepra. España.

Grupos de edad	Hombres	Mujeres	Total
0 – 14	0	0	0
15 – 24	1	0	1
25 – 44	0	4	4
45 – 64	2	2	4
65 y más	0	1	1
<b>Total Estatal</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

A 31 de diciembre de 2022 había 19 casos prevalentes registrados. En la tabla adjunta se expone la distribución geográfica de los casos nuevos y prevalentes por comunidad autónoma de residencia:

### Incidencia y prevalencia de lepra por comunidad autónoma de residencia, años 2021 y 2022. Registro Estatal de Lepra. España.

CCAA	2022		2021	
	Casos nuevos	Casos prevalentes	Casos nuevos	Casos prevalentes
Andalucía	1	3	3	2
Aragón	0	0	0	0
Asturias	2	2	0	0
Baleares	2	4	1	3
Canarias	0	0	0	0
Cantabria	1	1	0	1
Castilla-La Mancha	0	0	0	1
Castilla y León	0	0	0	0
Cataluña	0	0	0	1
C. Valenciana	1	3	0	2
Extremadura	0	0	0	0
Galicia	1	2	0	1
Madrid	0	1	0	3
Murcia	1	1	0	0
Navarra	0	0	0	0
País Vasco	0	1	0	1
La Rioja	1	1	0	0
Ceuta	0	0	0	0
Melilla	0	0	0	0
<b>Total Estatal</b>	<b>(8*) 10</b>	<b>19</b>	<b>(4*) 4</b>	<b>14</b>

\*Número de casos en personas de otros países y con residencia actual en España

El número de casos nuevos de lepra en España en 2022 superó en cinco a la cifra de 2021. La tendencia de los casos nuevos, tanto autóctonos como importados, refleja un ligero ascenso en la tendencia del último quinquenio. Respecto a los casos prevalentes, se mantiene la tendencia debido a la actualización de la información y el seguimiento de los casos hasta la finalización del tratamiento. Los clínicos deben mantener la sospecha diagnóstica de lepra en personas procedentes de países endémicos.