

# Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo

## Situación a 31 de marzo de 2020


El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España, utiliza la información de mortalidad por todas las causas que se obtiene diariamente de 3929 registros civiles informatizados del Ministerio de Justicia, correspondientes al 92% de la población española y que incluye todas las provincias. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada del 1 de enero 2008 hasta un año previo a la fecha actual.

Las defunciones observadas en los últimos 28 días se corrigen por el retraso en la notificación, teniendo en cuenta tres factores: el número de defunciones notificadas diariamente, la distribución de defunciones notificadas diariamente y del número promedio de fallecidos por día, aplicando una regularización a la estimación por máxima verosimilitud.

## Resultados a nivel nacional

A nivel nacional se estima un periodo de exceso por el sistema MoMo del 17 al 30 de marzo de 2020. Los resultados se describen a continuación.

Figura 1. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. España, diciembre 2019 hasta 31 de marzo de 2020



Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul).

En la tabla 1 se muestran las estimaciones del exceso de mortalidad durante el periodo de exceso señalado.

Tabla 1. Defunciones observadas, estimadas y exceso de defunciones por todas las causas, para toda la población, por sexo y por grupos de edad. España, del 17 al 30 de marzo de 2020.

| poblacion  | obs N | est N | exc N | exc % |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| todos      | 21243 | 15844 | 5398  | 34.1  |
| hombres    | 11236 | 7924  | 3312  | 41.8  |
| mujeres    | 9343  | 7575  | 1768  | 23.3  |
| edad < 65  | 2295  | 2170  | 124   | 5.7   |
| edad 65-74 | 2955  | 2188  | 766   | 35.0  |
| edad > 74  | 16004 | 11496 | 4508  | 39.2  |

obs N: número de defunciones observadas en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso

est N: número de defunciones estimadas, en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso

exc N: número de defunciones en exceso (observadas por encima de las estimadas)

exc %: porcentaje de defunciones en exceso


## Resultados por CCAA

Se observan excesos de mortalidad en las siguientes CCAA: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco.

### Andalucía

En Andalucía se estima un periodo de exceso por el sistema MoMo del 20 al 25 de marzo de 2020. Los resultados se describen a continuación.

Figura 2. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Andalucía, diciembre 2019 hasta 31 de marzo de 2020.



Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul).

En la tabla 2 se muestran las estimaciones del exceso de mortalidad durante el periodo de exceso señalado.

Tabla 2. Defunciones observadas, estimadas y exceso de defunciones por todas las causas, para toda la población, por sexo y por grupos de edad. Andalucía, del 20 al 25 de marzo de 2020.

| poblacion  | obs N | est N | exc N | exc % |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| todos      | 1372  | 1214  | 158   | 13.0  |
| hombres    | 683   | 621   | 62    | 10.0  |
| mujeres    | 663   | 570   | 92    | 16.2  |
| edad < 65  | 206   | 188   | 18    | 9.6   |
| edad 65-74 | 225   | 190   | 35    | 18.4  |
| edad > 74  | 941   | 838   | 103   | 12.3  |

obs N: número de defunciones observadas en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso

est N: número de defunciones estimadas, en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso


exc N: número de defunciones en exceso (observadas por encima de las estimadas)

exc %: porcentaje de defunciones en exceso

## Aragón

En Aragón se estima un periodo de exceso por el sistema MoMo del 23 al 30 de marzo de 2020. Los resultados se describen a continuación.

Figura 3. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Aragón, diciembre 2019 hasta 31 de marzo de 2020.



Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul).

En la tabla 3 se muestran las estimaciones del exceso de mortalidad durante el periodo de exceso señalado.

Tabla 3. Defunciones observadas, estimadas y exceso de defunciones por todas las causas, para toda la población, por sexo y por grupos de edad. Aragón, del 23 al 30 de marzo de 2020.

| poblacion  | obs N | est N | exc N | exc % |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| todos      | 443   | 250   | 194   | 77.6  |
| hombres    | 259   | 132   | 126   | 95.5  |
| mujeres    | 177   | 128   | 49    | 38.3  |
| edad < 65  | 41    | 24    | 18    | 74.5  |
| edad 65-74 | 56    | 32    | 24    | 75.0  |
| edad > 74  | 344   | 192   | 152   | 79.6  |

obs N: número de defunciones observadas en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso

est N: número de defunciones estimadas, en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso


exc N: número de defunciones en exceso (observadas por encima de las estimadas)

exc %: porcentaje de defunciones en exceso

## Islas Baleares

En Islas Baleares se estima un periodo de exceso por el sistema MoMo del 16 al 26 de marzo de 2020. Los resultados se describen a continuación.

Figura 4. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Islas Baleares, diciembre 2019 hasta 31 de marzo de 2020.



Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul).

En la tabla 4 se muestran las estimaciones del exceso de mortalidad durante el periodo de exceso señalado.

Tabla 4. Defunciones observadas, estimadas y exceso de defunciones por todas las causas, para toda la población, por sexo y por grupos de edad. Islas Baleares, del 16 al 26 de marzo de 2020.

| poblacion  | obs N | est N | exc N | exc % |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| todos      | 304   | 260   | 44    | 16.7  |
| hombres    | 159   | 120   | 38    | 32.0  |
| mujeres    | 116   | 110   | 6     | 5.5   |
| edad < 65  | 47    | 44    | 3     | 6.8   |
| edad 65-74 | 52    | 33    | 19    | 57.6  |
| edad > 74  | 203   | 187   | 16    | 8.6   |

obs N: número de defunciones observadas en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso

est N: número de defunciones estimadas, en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso


exc N: número de defunciones en exceso (observadas por encima de las estimadas)

exc %: porcentaje de defunciones en exceso

## Cantabria

En Cantabria se estima un periodo de exceso por el sistema MoMo del 24 al 30 de marzo de 2020. Los resultados se describen a continuación.

Figura 5. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Cantabria, diciembre 2019 hasta 31 de marzo de 2020.



Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul).

En la tabla 5 se muestran las estimaciones del exceso de mortalidad durante el periodo de exceso señalado.

Tabla 5. Defunciones observadas, estimadas y exceso de defunciones por todas las causas, para toda la población, por sexo y por grupos de edad. Cantabria, del 24 al 30 de marzo de 2020.

| poblacion  | obs N | est N | exc N | exc % |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| todos      | 123   | 97    | 26    | 26.8  |
| hombres    | 62    | 42    | 20    | 47.6  |
| mujeres    | 57    | 42    | 15    | 35.7  |
| edad < 65  | 11    | 14    | 0     | 0.0   |
| edad 65-74 | 18    | 14    | 4     | 28.6  |
| edad > 74  | 91    | 64    | 27    | 42.2  |

obs N: número de defunciones observadas en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso

est N: número de defunciones estimadas, en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso


exc N: número de defunciones en exceso (observadas por encima de las estimadas)

exc %: porcentaje de defunciones en exceso

## Castilla y León

En Castilla y León se estima un periodo de exceso por el sistema MoMo del 18 al 30 de marzo de 2020. Los resultados se describen a continuación.

Figura 6. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Castilla y León, diciembre 2019 hasta 31 de marzo de 2020.



Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul).

En la tabla 6 se muestran las estimaciones del exceso de mortalidad durante el periodo de exceso señalado.

Tabla 6. Defunciones observadas, estimadas y exceso de defunciones por todas las causas, para toda la población, por sexo y por grupos de edad. Castilla y León, del 18 al 30 de marzo de 2020.

| poblacion  | obs N | est N | exc N | exc % |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| todos      | 1877  | 808   | 1068  | 132.2 |
| hombres    | 1029  | 415   | 614   | 148.0 |
| mujeres    | 831   | 386   | 446   | 115.6 |
| edad < 65  | 132   | 91    | 41    | 45.1  |
| edad 65-74 | 219   | 96    | 122   | 126.9 |
| edad > 74  | 1525  | 630   | 896   | 142.3 |

obs N: número de defunciones observadas en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso

est N: número de defunciones estimadas, en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso


exc N: número de defunciones en exceso (observadas por encima de las estimadas)

exc %: porcentaje de defunciones en exceso

## Castilla La Mancha

En Castilla La Mancha se estima un periodo de exceso por el sistema MoMo del 14 al 31 de marzo de 2020. Los resultados se describen a continuación.

Figura 7. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Castilla La Mancha, diciembre 2019 hasta 31 de marzo de 2020.



Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul).

En la tabla 7 se muestran las estimaciones del exceso de mortalidad durante el periodo de exceso señalado.

Tabla 7. Defunciones observadas, estimadas y exceso de defunciones por todas las causas, para toda la población, por sexo y por grupos de edad. Castilla La Mancha, del 14 al 31 de marzo de 2020.

| poblacion  | obs N | est N | exc N | exc % |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| todos      | 2333  | 950   | 1382  | 145.4 |
| hombres    | 1254  | 477   | 777   | 162.9 |
| mujeres    | 1060  | 452   | 608   | 134.5 |
| edad < 65  | 193   | 104   | 90    | 86.5  |
| edad 65-74 | 295   | 104   | 190   | 182.3 |
| edad > 74  | 1840  | 742   | 1098  | 148.1 |

obs N: número de defunciones observadas en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso

est N: número de defunciones estimadas, en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso


exc N: número de defunciones en exceso (observadas por encima de las estimadas)

exc %: porcentaje de defunciones en exceso

## Cataluña

En Cataluña se estima un periodo de exceso por el sistema MoMo del 21 al 30 de marzo de 2020. Los resultados se describen a continuación.

Figura 8. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Cataluña, diciembre 2019 hasta 31 de marzo de 2020.



Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul).

En la tabla 8 se muestran las estimaciones del exceso de mortalidad durante el periodo de exceso señalado.

Tabla 8. Defunciones observadas, estimadas y exceso de defunciones por todas las causas, para toda la población, por sexo y por grupos de edad. Cataluña, del 21 al 30 de marzo de 2020.

| poblacion  | obs N | est N | exc N | exc % |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| todos      | 2550  | 1805  | 745   | 41.3  |
| hombres    | 1227  | 878   | 349   | 39.7  |
| mujeres    | 1115  | 836   | 280   | 33.5  |
| edad < 65  | 267   | 243   | 24    | 9.9   |
| edad 65-74 | 357   | 234   | 123   | 52.6  |
| edad > 74  | 1923  | 1318  | 604   | 45.8  |

obs N: número de defunciones observadas en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso

est N: número de defunciones estimadas, en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso


exc N: número de defunciones en exceso (observadas por encima de las estimadas)

exc %: porcentaje de defunciones en exceso

## Comunitat Valenciana

En Comunitat Valenciana se estima un periodo de exceso por el sistema MoMo del 22 al 30 de marzo de 2020. Los resultados se describen a continuación.

Figura 9. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Comunitat Valenciana, diciembre 2019 hasta 31 de marzo de 2020.



Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul).

En la tabla 9 se muestran las estimaciones del exceso de mortalidad durante el periodo de exceso señalado.

Tabla 9. Defunciones observadas, estimadas y exceso de defunciones por todas las causas, para toda la población, por sexo y por grupos de edad. Comunitat Valenciana, del 22 al 30 de marzo de 2020.

| poblacion  | obs N | est N | exc N | exc % |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| todos      | 1607  | 1126  | 482   | 42.8  |
| hombres    | 866   | 578   | 288   | 50.0  |
| mujeres    | 722   | 536   | 186   | 34.6  |
| edad < 65  | 191   | 150   | 42    | 27.8  |
| edad 65-74 | 241   | 157   | 84    | 53.5  |
| edad > 74  | 1174  | 804   | 370   | 45.9  |

obs N: número de defunciones observadas en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso

est N: número de defunciones estimadas, en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso


exc N: número de defunciones en exceso (observadas por encima de las estimadas)

exc %: porcentaje de defunciones en exceso

## Extremadura

En Extremadura se estima un periodo de exceso por el sistema MoMo del 24 al 25 de marzo de 2020. Los resultados se describen a continuación.

Figura 10. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Extremadura, diciembre 2019 hasta 31 de marzo de 2020.



Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul).

En la tabla 10 se muestran las estimaciones del exceso de mortalidad durante el periodo de exceso señalado.

Tabla 10. Defunciones observadas, estimadas y exceso de defunciones por todas las causas, para toda la población, por sexo y por grupos de edad. Extremadura, del 24 al 25 de marzo de 2020.

| poblacion  | obs N | est N | exc N | exc % |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| todos      | 94    | 56    | 38    | 69.4  |
| hombres    | 53    | 30    | 23    | 76.7  |
| mujeres    | 39    | 26    | 13    | 50.0  |
| edad < 65  | 7     | 6     | 1     | 16.7  |
| edad 65-74 | 21    | 8     | 13    | 162.5 |
| edad > 74  | 65    | 40    | 24    | 60.5  |

obs N: número de defunciones observadas en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso

est N: número de defunciones estimadas, en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso


exc N: número de defunciones en exceso (observadas por encima de las estimadas)

exc %: porcentaje de defunciones en exceso

## Comunidad de Madrid

En Comunidad de Madrid se estima un periodo de exceso por el sistema MoMo del 10 al 24 de marzo de 2020. Los resultados se describen a continuación.

Figura 11. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Comunidad de Madrid, diciembre 2019 hasta 31 de marzo de 2020.



Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul).

En la tabla 11 se muestran las estimaciones del exceso de mortalidad durante el periodo de exceso señalado.

Tabla 11. Defunciones observadas, estimadas y exceso de defunciones por todas las causas, para toda la población, por sexo y por grupos de edad. Comunidad de Madrid, del 10 al 24 de marzo de 2020.

| poblacion  | obs N | est N | exc N | exc % |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| todos      | 3345  | 1696  | 1650  | 97.3  |
| hombres    | 1787  | 822   | 964   | 117.3 |
| mujeres    | 1400  | 812   | 588   | 72.4  |
| edad < 65  | 297   | 242   | 55    | 22.7  |
| edad 65-74 | 439   | 232   | 208   | 89.6  |
| edad > 74  | 2604  | 1224  | 1380  | 112.7 |

obs N: número de defunciones observadas en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso

est N: número de defunciones estimadas, en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso


exc N: número de defunciones en exceso (observadas por encima de las estimadas)

exc %: porcentaje de defunciones en exceso

## Navarra

En Navarra se estima un periodo de exceso por el sistema MoMo del 22 al 30 de marzo de 2020. Los resultados se describen a continuación.

Figura 12. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Navarra, diciembre 2019 hasta 31 de marzo de 2020.



Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul).

En la tabla 12 se muestran las estimaciones del exceso de mortalidad durante el periodo de exceso señalado.

Tabla 12. Defunciones observadas, estimadas y exceso de defunciones por todas las causas, para toda la población, por sexo y por grupos de edad. Navarra, del 22 al 30 de marzo de 2020.

| poblacion  | obs N | est N | exc N | exc % |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| todos      | 314   | 139   | 175   | 125.9 |
| hombres    | 173   | 76    | 96    | 126.1 |
| mujeres    | 137   | 65    | 72    | 110.8 |
| edad < 65  | 22    | 18    | 4     | 22.2  |
| edad 65-74 | 46    | 18    | 28    | 155.6 |
| edad > 74  | 244   | 107   | 137   | 128.0 |

obs N: número de defunciones observadas en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso

est N: número de defunciones estimadas, en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso


exc N: número de defunciones en exceso (observadas por encima de las estimadas)

exc %: porcentaje de defunciones en exceso

## País Vasco

En País Vasco se estima un periodo de exceso por el sistema MoMo del 25 al 29 de marzo de 2020. Los resultados se describen a continuación.

Figura 13. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. País Vasco, diciembre 2019 hasta 31 de marzo de 2020.



Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul).

En la tabla 13 se muestran las estimaciones del exceso de mortalidad durante el periodo de exceso señalado.

Tabla 13. Defunciones observadas, estimadas y exceso de defunciones por todas las causas, para toda la población, por sexo y por grupos de edad. País Vasco, del 25 al 29 de marzo de 2020.

| poblacion  | obs N | est N | exc N | exc % |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| todos      | 477   | 294   | 182   | 62.0  |
| hombres    | 254   | 144   | 110   | 76.4  |
| mujeres    | 210   | 142   | 68    | 47.9  |
| edad < 65  | 45    | 35    | 10    | 28.6  |
| edad 65-74 | 53    | 35    | 18    | 51.4  |
| edad > 74  | 376   | 221   | 155   | 69.9  |

obs N: número de defunciones observadas en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso

est N: número de defunciones estimadas, en el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin de exceso

exc N: número de defunciones en exceso (observadas por encima de las estimadas)

exc %: porcentaje de defunciones en exceso

## Conclusiones

Los resultados obtenidos con MoMo estiman que se ha producido un exceso de mortalidad por todas las causas a nivel nacional del 17 al 30 de marzo de 2020 de un 34%. El exceso es más notable en hombres (42%) que en mujeres (23%), y se concentra en los mayores de 74 años (39%), seguido del grupo de edad de 65 a 74 años (35%).

A nivel de CCAA se han detectado excesos de mortalidad en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco. En ellas, el exceso de mortalidad se concentra en los grupos de edad de mayores de 74 y entre 65 y 74 años. Y en general, el exceso es mayor en hombres que en mujeres.

En otras CCAA (Asturias, Canarias) se observan excesos puntuales de mortalidad de 1 día, que se concentran en mayores de 74 años, y que sobrepasan el límite superior del IC 99% sobre las defunciones estimadas, pero sin llegar a mantenerse el exceso al menos dos días consecutivos. Se seguirá evaluando la situación en los próximos días.

En el momento actual observamos un retraso en la notificación de defunciones en los registros civiles de varias CCAA, siendo notable en Galicia Madrid y La Rioja. Los resultados de los días más recientes se irán actualizando próximamente.

España participa en la red europea EuroMOMO<sup>1</sup> para la estimación de los excesos de mortalidad por todas las causas con un modelo común en todos los países. Las actualizaciones de las últimas dos semanas indican también un exceso de mortalidad en España a nivel nacional que se concentra fundamentalmente en los mayores de 64 años. Los excesos se observan también en otros países de nuestro entorno.

<sup>1</sup> EuroMOMO. European monitoring of excess mortality for public health action. Disponible en: <http://www.euromomo.eu/> Los datos se actualizan el jueves-viernes de cada semana.

## Aclaraciones metodológicas

Los datos de defunciones observadas son de carácter provisional, ya que el sistema se alimenta diariamente de las defunciones notificadas desde los Registros Civiles informatizados al Ministerio de Justicia, ocurridas en los últimos días. Cabe destacar que en estos momentos el retraso entre la fecha de defunción y la de notificación se está incrementando. Por este motivo, tanto los datos de defunciones observadas como los excesos detectados por el sistema MoMo pueden variar en cada actualización.

Además, sobre los datos de defunciones observadas de los últimos 28 días se realiza una corrección por retraso para corregir la cifra real de defunciones notificadas. Esta corrección se ejecuta de forma independiente para toda la población y por grupos de sexo y edad. Por este motivo, puede observarse que la suma entre los subgrupos analizados puede no coincidir con la cifra exacta de los excesos de defunciones en toda la población. Otro hecho que también provoca este mismo efecto es que un pequeño porcentaje de defunciones notificadas que no tienen información sobre sexo.