

## ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LOS CASOS DE MPOX EN ESPAÑA, 2026

Datos extraídos de SiViES el 01/06/2026 a las 09:00h

Desde el inicio de brote en abril de 2022 hasta el 1 de junio de 2026 se han notificado un total de 9.629 casos confirmados de mpox (tabla 1).

**Tabla 1. Número de casos confirmados de mpox e incidencia por 100.000 habitantes, 2022-2026**

| Año          | Nº (%)             | Incidencia por 100.000 habitantes |
|--------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2022         | 7.522 (78,1)       | 15,84                             |
| 2023         | 325 (3,4)          | 0,68                              |
| 2024         | 695 (7,2)          | 1,43                              |
| 2025         | 831 (8,6)          | 1,69                              |
| 2026         | 256 (2,7)          | 0,51                              |
| <b>Total</b> | <b>9.629 (100)</b> |                                   |

La distribución de casos por Comunidad Autónoma se muestra en la tabla 2. En el periodo 2022-2026 todas las Comunidades Autónomas han notificado casos excepto Ceuta y Melilla.

**Tabla 2. Nº de casos confirmados de mpox declarados en SiViES según año y CCAA de notificación, 2022-2026**

| CCAA               | Total casos<br>Nº (%) | Casos 2022<br>Nº (%) | Casos 2023<br>Nº (%) | Casos 2024<br>Nº (%) | Casos 2025<br>Nº (%) | Casos 2026<br>Nº (%) |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Andalucía          | 1.192 (12,4)          | 884 (11,8)           | 37 (11,4)            | 110 (15,8)           | 55 (6,6)             | 106 (41,4)           |
| Aragón             | 90 (0,9)              | 74 (1,0)             | 5 (1,5)              | 0                    | 7 (0,8)              | 4 (1,6)              |
| Asturias           | 65 (0,7)              | 59 (0,8)             | 2 (0,6)              | 0                    | 4 (0,5)              | 0                    |
| Baleares           | 275 (2,9)             | 216 (2,9)            | 15 (4,6)             | 16 (2,3)             | 15 (1,8)             | 13 (5,1)             |
| Canarias           | 217 (2,3)             | 176 (2,3)            | 0                    | 7 (1,0)              | 18 (2,2)             | 16 (6,3)             |
| Cantabria          | 39 (0,4)              | 36 (0,5)             | 0                    | 2 (0,3)              | 1 (0,1)              | 0                    |
| Castilla La Mancha | 99 (1,0)              | 66 (0,9)             | 3 (0,9)              | 14 (2,0)             | 12 (1,4)             | 4 (1,6)              |
| Castilla y León    | 99 (1,0)              | 85 (1,1)             | 3 (0,9)              | 4 (0,6)              | 4 (0,5)              | 3 (1,2)              |
| Cataluña           | 2.980 (30,9)          | 2.330 (31,0)         | 103 (31,7)           | 270 (38,8)           | 264 (31,8)           | 13 (5,1)             |
| Extremadura        | 51 (0,5)              | 32 (0,4)             | 1 (0,3)              | 1 (0,1)              | 0                    | 17 (6,6)             |
| Galicia            | 152 (1,6)             | 122 (1,6)            | 2 (0,6)              | 6 (0,9)              | 7 (0,8)              | 15 (5,9)             |
| Madrid             | 3.221 (33,5)          | 2.534 (33,8)         | 117 (36,0)           | 224 (32,2)           | 346 (41,7)           | 0                    |
| Murcia             | 114 (1,2)             | 89 (1,2)             | 10 (3,1)             | 7 (1,0)              | 4 (0,5)              | 4 (1,6)              |
| Navarra            | 24 (0,3)              | 21 (0,3)             | 0                    | 2 (0,3)              | 0                    | 1 (0,4)              |
| País Vasco         | 281 (2,9)             | 245 (3,3)            | 1 (0,3)              | 13 (1,9)             | 8 (1,0)              | 14 (5,5)             |
| La Rioja           | 12 (0,1)              | 6 (0,1)              | 0                    | 0                    | 6 (0,7)              | 0                    |
| C. Valenciana      | 718 (7,5)             | 547 (7,3)            | 26 (8,0)             | 19 (2,7)             | 80 (9,6)             | 46 (18,0)            |
| <b>Total</b>       | <b>9.629</b>          | <b>7.522</b>         | <b>325</b>           | <b>695</b>           | <b>831</b>           | <b>256</b>           |

Para información más detallada del periodo 2022-2025, se puede consultar el siguiente link:  
<https://cne.isciii.es/documents/d/cne/situacion-epidemiologica-de-los-casos-de-mpox-2022-2025>

A continuación, se describen las características de los casos notificados en 2025 y 2026.

### 1. Características de los casos

Las características de los casos por año se muestran en la tabla 3. En el año 2026 la mayor parte fueron hombres (96,9%), al igual que en 2025.

La edad osciló entre 14 y 65 años en 2026 (1-80 años en 2025), con una mediana de edad de 39 años (rango intercuartílico (RIC): 32-46 años). El 64,0% de los casos tenía entre 30 y 49 años, similar al año previo.

En 2026, el 48,8% (125 casos) habían nacido en España y el 14,8% en países de Latinoamérica. El porcentaje de casos sin información es superior al de 2025 (30,9% frente a 26,6%).

**Tabla 3. Características demográficas de los casos de mpox declarados en SiViES, 2025-2026**

| Características demográficas       | 2025             | 2026             |
|------------------------------------|------------------|------------------|
|                                    | Nº (%)           | Nº (%)           |
| Sexo                               |                  |                  |
| Hombre                             | 802 (96,5)       | 248 (96,9)       |
| Mujer                              | 29 (3,5)         | 8 (3,1)          |
| Grupos de edad                     |                  |                  |
| Menor de 20                        | 7 (0,8)          | 2 (0,8)          |
| 20-29                              | 198 (23,8)       | 42 (16,4)        |
| 30-39                              | 350 (42,1)       | 92 (35,9)        |
| 40-49                              | 182 (21,9)       | 72 (28,1)        |
| 50-59                              | 77 (9,3)         | 39 (15,2)        |
| 60 y más                           | 15 (1,8)         | 6 (2,4)          |
| No consta                          | 2 (0,3)          | 3 (1,2)          |
| Región de nacimiento               |                  |                  |
| España                             | 265 (31,9)       | 125 (48,8)       |
| Europa Occidental                  | 33 (4,0)         | 4 (1,6)          |
| Europa Central – Este              | 14 (1,7)         | 4 (1,6)          |
| Latinoamérica                      | 272 (32,7)       | 38 (14,8)        |
| África del Norte y Oriente Próximo | 12 (1,4)         | 5 (1,9)          |
| África Subsahariana                | 4 (0,5)          | 0                |
| Otros                              | 10 (1,2)         | 1 (0,4)          |
| Desconocido                        | 221 (26,6)       | 79 (30,9)        |
| <b>Total</b>                       | <b>831 (100)</b> | <b>256 (100)</b> |

### 2. Características de la enfermedad


La distribución de los casos por mes de inicio de síntomas se muestra en la figura 1.

De los 1.087 casos notificados desde el 1 de enero de 2025 hasta el cierre de este informe, 1.059 (97,4%) disponen de fecha de inicio de síntomas.

La mediana en días entre la fecha de inicio del primer síntoma y la fecha de confirmación por laboratorio fue de 8 días (RIC [6-12]) y de 7 días (RIC [4-10]) en 2025. Respecto a la diferencia

entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de declaración a nivel de CCAA fue de 9 días en 2026 (RIC [6-12]) y de 3 días en 2025 (RIC [0-9,5]).

**Figura 1. Curva epidémica de casos confirmados según mes y año de inicio de síntomas, 2022-2025**



Los 17 casos con fecha de inicio de síntomas en mayo de 2026 han sido notificados por Andalucía (13 casos) y Canarias (4 casos).

#### a) Aspectos clínicos

Las características clínicas de los casos por año se muestran en la tabla 4. En el año 2026 un total de 191 casos (74,6%) presentaron alguna sintomatología general a lo largo de su proceso clínico (fiebre, astenia, dolor de garganta, dolor muscular o cefalea). La fiebre fue el síntoma general más frecuente (135 casos, 52,7%). Un total de 110 casos (43,0%) presentaron linfadenopatías

localizadas. El exantema se localizó en la zona anogenital en 172 casos (67,2%), en la zona oral-bucal en 60 casos (23,4%) y en 147 (57,4%) en otras localizaciones (figura 2).

Un 12,9% del total de casos presentaron complicaciones a lo largo de su proceso clínico, con un ligero aumento en el porcentaje respecto a 2025 (8,9%). De ellas, las más frecuentes en 2026 han sido la infección bacteriana secundaria (48,5%) y las úlceras bucales (33,3%).

En 2026 se han notificado 24 hospitalizaciones (9,4%). Todos fueron hombres, con una mediana de edad de 39,5 años (RIC [34-47]), sin diferencias con casos hospitalizados en 2025 (33,5 años (RIC [28-41])). En los casos hospitalizados en 2026 donde la fecha de ingreso y de alta estaba disponible, la estancia mediana en el hospital de 5 días (RIC [3-8]).

En 2026 se ha notificado un caso de mpox clado II en un hombre, entre 50 y 60 años, que requirió ingreso en la UCI debido a una sepsis y que finalmente falleció. Esta persona presentaba infección por el VIH en estadio avanzado de inmunosupresión. No había sido vacunado frente a mpox.


**Tabla 4. Características clínicas de los casos de mpox según año, 2025-2026**

| Aspectos clínicos                      | 2025<br>Nº (%) | 2026<br>Nº (%) |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Presencia de manifestaciones clínicas* |                |                |
| Síntomas generales:                    | 508 (61,1)     | 191 (74,6)     |
| Fiebre                                 | 380 (45,7)     | 135 (52,7)     |
| Astenia                                | 228 (27,4)     | 99 (38,7)      |
| Dolor de garganta                      | 158 (19,0)     | 95 (37,1)      |
| Dolor muscular                         | 150 (18,1)     | 68 (26,6)      |
| Cefalea                                | 135 (16,3)     | 63 (24,6)      |
| Linfadenopatías:                       |                |                |
| Localizadas                            | 336 (40,4)     | 110 (43,0)     |
| Generalizadas                          | 25 (3,0)       | 16 (6,3)       |
| Exantema:                              |                |                |
| Anogenital                             | 594 (71,5)     | 172 (67,2)     |
| Oro-bucal                              | 111 (13,4)     | 60 (23,4)      |
| Otras localizaciones                   | 373 (44,9)     | 147 (57,4)     |
| Complicaciones                         | 73 (8,9)       | 33 (12,9)      |
| Tipo de complicaciones**               |                |                |
| Infección bacteriana secundaria        | 31 (42,5)      | 16 (48,5)      |
| Úlcera bucal                           | 25 (34,2)      | 11 (33,3)      |
| Infección corneal                      | 2 (2,7)        | 1 (3,0)        |
| Sepsis                                 | 1 (1,4)        | 1 (3,0)        |
| Proctitis                              | 2 (2,7)        | 0 (0,0)        |
| Miocarditis/miopericarditis            | 1 (1,4)        | 0 (0,0)        |
| Hospitalización                        | 50 (6,0)       | 24 (9,4)       |
| Hospitalización en UCI                 | 2 (0,2)        | 1 (0,4)        |

\*Un paciente puede presentar más de una manifestación clínica. Los porcentajes están calculados sobre el total de casos en cada año.

\*\*Porcentajes calculados sobre el total de casos con complicaciones

**Figura 2. Manifestaciones clínicas de los casos de mpox, 2025-2026**



#### b) Antecedentes personales

Un total de 77 casos de mpox (32,6% de los 236 casos con información) presentaron coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en 2026, sin cambios respecto a 2025 (tabla 5).

Respecto a la vacunación en 2026, 226 casos (88,3%) no estaban vacunados o se desconocía su estado vacunal, sin variación respecto al año previo (tabla 5). De los 24 casos vacunados en 2026, 3 (12,5%) habían recibido solo una dosis, 19 (79,2%) dos dosis y en 2 casos (8,3%) no constaba esta información. En 2025, el 64,1% de los casos vacunados (59 casos) había recibido dos dosis, 32,2% una sola dosis (29 casos) y en 4 casos (3,7%) no se disponía de información.

**Tabla 5. Antecedentes personales de los casos de mpox según año, 2025-2026**

| Antecedentes personales        | 2025<br>Nº (%) | 2026<br>Nº (%) |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Coinfección con el VIH *       | 265 (34,9)     | 77 (32,6)      |
| Estado vacunal                 |                |                |
| Vacunado frente a mpox         | 92 (11,1)      | 24 (9,4)       |
| Vacunado solo frente a viruela | 19 (2,3)       | 6 (2,3)        |
| No vacunado/desconocido        | 720 (86,6)     | 226 (88,3)     |

\* Porcentajes calculados sobre el total de casos con información en esa variable

### c) Datos de laboratorio


En 2026, los casos fueron confirmados por PCR realizada en muestras de lesiones cutáneas (96 casos), líquido vesicular (134 casos), 10 casos en otras muestras y en 16 se desconoce esa información. Respecto al año previo ha aumentado el porcentaje de casos confirmados realizados en muestras de líquido vesicular (tabla 6).

**Tabla 6. Tipo de muestra de los casos de mpox según año, 2022-2025**

| Tipo de muestra       | 2025<br>Nº (%)   | 2026<br>Nº (%)   |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Lesión cutánea        | 450 (54,1)       | 96 (37,5)        |
| Líquido vesicular     | 224 (27,0)       | 134 (52,3)       |
| Otra muestra          | 75 (9,0)         | 10 (3,9)         |
| No consta información | 82 (9,9)         | 16 (6,3)         |
| <b>Total</b>          | <b>831 (100)</b> | <b>256 (100)</b> |

Desde agosto de 2024 se recoge información sobre el clado. El porcentaje de casos por tipo de clado calculado sobre el total de casos según mes de inicio de síntomas o de diagnóstico se muestra en la figura 3.

**Figura 3. Porcentaje de casos por tipo de clado sobre el total de casos según mes, 2025-2026**



El primer caso de clado Ib se identificó en España en septiembre de 2025 en un caso importado de Tanzania y en octubre de 2025 se comunicó el primer caso de clado Ib de transmisión comunitaria en España. En 2025 se han notificado 58 casos de clado I/Ib (7% del total de casos) y en 2026, 149 casos (58,2%) (tabla 7).

**Tabla 7. Distribución de los casos de mpox según clado y subclado, 2025-2026**

| Clado                 | Enero-diciembre<br>2025 | Enero-junio<br>2026 |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Clado I               | 15                      | 20                  |
| Clado Ib              | 43                      | 129                 |
| Clado II              | 493                     | 55                  |
| Clado IIa             | 1                       | 0                   |
| Clado IIb             | 6                       | 3                   |
| No consta información | 273                     | 49                  |
| <b>Total</b>          | <b>831</b>              | <b>256</b>          |

### 3. Características de la exposición

El 18,8% de casos reportaron un contacto estrecho con un caso probable o confirmado en 2026. Un 10,2% refirieron antecedente de viaje en los 21 días previos a la fecha de inicio de síntomas (14,2% en 2025). Un total de 9 casos (3,5%) fueron clasificados como casos importados (porcentaje superior respecto a 2025) (tabla 8).

**Tabla 8. Características de la exposición de los casos de mpox según año, 2025-2026**

| Exposición                                   | 2025<br>Nº (%)   | 2026<br>Nº (%)   |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Contacto estrecho con un caso                |                  |                  |
| Sí                                           | 110 (13,3)       | 48 (18,8)        |
| No/No consta                                 | 721 (86,7)       | 208 (81,2)       |
| Antecedente de viaje (21 días previos a FIS) |                  |                  |
| Sí                                           | 118 (14,2)       | 26 (10,2)        |
| No/No consta                                 | 713 (85,8)       | 230 (89,8)       |
| Importado                                    |                  |                  |
| Sí                                           | 21 (2,5)         | 9 (3,5)          |
| No/No consta                                 | 810 (97,5)       | 247 (96,5)       |
| <b>Total</b>                                 | <b>831 (100)</b> | <b>256 (100)</b> |

\*FIS: fecha de inicio de síntomas

El mecanismo de transmisión más probable se atribuyó a un contacto estrecho en el contexto de una relación sexual (69,5%), porcentaje inferior a 2025 (81,5%). En 2026, se ha notificado un caso de transmisión ocupacional en el ámbito sanitario. El porcentaje de casos sin información sobre el modo de transmisión es mayor en 2026 (tabla 9).

**Tabla 9. Mecanismo de transmisión de los casos de mpox según año, 2022-2025**

| Mecanismo de transmisión    | 2025<br>Nº (%)   | 2026<br>Nº (%)   |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Contacto estrecho sexual    | 677 (81,5)       | 178 (69,5)       |
| Contacto estrecho no sexual | 24 (2,9)         | 10 (3,9)         |
| Otro                        | 1 (0,1)          | 1 (0,4)          |
| No consta información       | 129 (15,5)       | 67 (26,2)        |
| <b>Total</b>                | <b>831 (100)</b> | <b>256 (100)</b> |

Respecto a la orientación sexual de los casos, excluyendo los menores de 14 años, la mayor parte eran hombres que habían tenido relaciones sexuales con otros hombres (tabla 10).

**Tabla 10. Orientación sexual de los casos de mpox según año, 2025-2026**

| Orientación sexual                 | 2025<br>Nº (%)   | 2026<br>Nº (%)   |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Hombres que tiene sexo con hombres | 645 (77,8)       | 189 (73,8)       |
| Hombre heterosexual                | 22 (2,7)         | 9 (3,5)          |
| Mujer heterosexual                 | 21 (2,5)         | 4 (1,6)          |
| Mujer bisexual                     | 1 (0,1)          | 0 (0,0)          |
| No consta información              | 140 (16,9)       | 54 (21,1)        |
| <b>Total</b>                       | <b>829 (100)</b> | <b>256 (100)</b> |

#### 4. Conclusiones:

- Se continúan notificando casos de mpox en España.
- No se observan cambios significativos en las características clínicas y epidemiológicas de los casos identificados en 2025 y 2026.